

Lo que necesitas saber sobre la inyección de buprenorphine “bupe”

Aspectos básicos del shot de buprenorfina “bupe”:

- **Programa de Inyección:** Puedes elegir recibir la inyección cada semana o cada mes.
- **Administración de la Inyección:** Un médico te dará la inyección en el brazo, estómago, piernas o caderas. Puede que se forme una pequeña protuberancia. Comienza a hacer efecto en 24 horas.
- **Dosis de Bupe:** La dosis en la inyección será tan fuerte como la dosis en las tiras, o aun más fuerte.
- **Liberación Lenta:** La buprenorfina se libera lentamente durante una semana o un mes.
- **Cómo ayuda:** La inyección evita que te sientas enfermo, te ayuda a desear menos los opioides y bloquea otros opioides durante una semana o un mes.

Por qué podría ser adecuado:

- **Sin Medicación Diaria:** Si no quieres tomar medicamentos todos los días, el shot de bupe podría ser una buena opción.
- **Menos preocupaciones:** No tienes que preocuparte por mantener segura la medicación.
- **Dificultades para empezar tiras de bupe:** Si has tenido dificultades para empezar tiras de bupe antes, el shot de bupe puede ser más fácil.
- **Listo para dejar la buprenorfina:** Si estás listo para dejar el tratamiento con buprenorfina, esto podría ayudar.

¿Voy a tener síntomas de abstinencia?

- **Cambio desde tiras de bupe:** Probablemente no experimentarás síntomas de abstinencia.
- **No en tiras de bupe:** Puedes tener algunos síntomas de abstinencia durante las primeras 24 horas después de la inyección. Tu médico te dará medicamentos para ayudarte.
- **Dejar el shot de bupe:** La mayoría de las personas no experimentan síntomas de abstinencia al dejar el shot de bupe.

Posibles efectos secundarios:

- **Efectos Secundarios Comunes:** Principalmente dolor, enrojecimiento o picazón en el sitio de la inyección. Fatiga después de la primera inyección.
- **Otros Efectos Secundarios:** Dolor de cabeza, estreñimiento, náuseas, como con las tiras de bupe.
- **Efectos Secundarios a Largo Plazo:** No hay efectos secundarios a largo plazo conocidos con el shot de bupe.

Interacciones:

- **Con otros medicamentos:** El shot de bupe no interactuará con la mayoría de los medicamentos que puedas estar tomando para la salud mental, el VIH, la presión arterial u otros.
- **Con otros opioides:** El shot de bupe bloquea otros opioides. Si tienes dolor, informa a tus médicos que estás en el shot de bupe para que puedan encontrar la dosis adecuada de medicamento para el dolor para ti.
- **Con otras sustancias:** El shot de bupe no interactuará con ninguna otra sustancia no opioide que estés usando.

Preguntas que podrías tener:

- **Tener un bloqueador de opioides durante mucho tiempo:** Habla con tu médico si te preocupa tener un bloqueador de opioides en tu cuerpo durante una semana o un mes.
- **Estar embarazada:** No sabemos mucho sobre el shot de bupe durante el embarazo. Consulta a tu médico sobre lo que es seguro. No te impedirá quedar embarazada.

La inyección de Bupe: Lo Que Necesitas Saber

1 ¿Por qué recibir la inyección de bupe?

- No quiere tomar un medicamento diario.
- No quiere preocuparse por mantener el medicamento seguro.
- Quiere tener menos síntomas de abstinencia al comenzar o dejar de usar bupe.
- Quiere tener una cantidad constante de bupe en tu cuerpo.

2 Conceptos básicos de la inyección de bupe

- Hay inyecciones semanales y mensuales.
- Si está comenzando a usar bupe por primera vez, generalmente recibirás primero una inyección semanal.
- El bupe se libera lentamente en su cuerpo durante una semana o un mes.

3 Expectativas del sitio de inyección

- La inyección dejará un pequeño bulto bajo tu piel. Evite frotar el bulto.
- Es posible que desarrolles enrojecimiento, dolor o picazón en el sitio de inyección.
- Puede usar acetaminofén (Tylenol®) o ibuprofeno (Motrin®) y aplicar hielo.
- Si no mejora dentro de 24 horas, llame a su médico.

4 Otros efectos secundarios

- Cansancio durante los primeros 1-2 días después de la inyección.
- Dolor de cabeza.
- Problemas para dormir.
- Por lo demás, efectos similares a las tiras de bupe (malestar estomacal, estreñimiento, etc.).

5 ¿Qué pasa si tengo síntomas de abstinencia?

- Su médico puede recetarle medicamentos para el dolor, las náuseas, la diarrea y la ansiedad.
- Tome su bupe sublingual (espera al menos 24 horas después de la inyección).
- Llame a la clínica para recibir su próxima inyección antes de tiempo.

6 ¿Cómo puedo obtener más información?

- Hable con su proveedor de atención médica.