


A


Testicular Cancer ASDR in 1990
80°N
60°N
40°N
20°N
0°
20°S
40°S
60°S
120°W
60°W
0°
60°E
120°E
ASDR
30
20
10


B


Testicular Cancer ASMR in 1990
80°N
60°N
40°N
20°N
0°
20°S
40°S
60°S
120°W
60°W
0°
60°E
120°E
ASMR
0.6
0.4
0.2


C


Testicular Cancer ASDR in 2023
80°N
60°N
40°N
20°N
0°
20°S
40°S
60°S
120°W
60°W
0°
60°E
120°E
ASDR
30
20
10


D


Testicular Cancer ASMR in 2023
80°N
60°N
40°N
20°N
0°
20°S
40°S
60°S
120°W
60°W
0°
60°E
120°E
ASMR
0.6
0.4
0.2

E


ASDR for Testicular cancer , 1990-2023
ASDR (per 100,000)
10
9
8
7
6
5
4
1990
2000
2010
2020
Year
Region
Global
High SDI
Low SDI
High-middle SDI
Low-middle SDI
Middle SDI

F


ASMR for Testicular cancer , 1990-2023
ASMR (per 100,000)
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
1990
2000
2010
2020
Year
Region
Global
High SDI
Low SDI
High-middle SDI
Low-middle SDI
Middle SDI