

SUPPLEMENTARY MATERIAL

INTERNATIONAL MICROBIOLOGY

Isolation of endophytic strains of *Bacillus thuringiensis* from wild plant seeds: A potential new biotechnological development.

Areli Cando-Narvaez¹, M. Cristina Del Rincón-Castro², M. Socorro González-Elizondo³, Jorge E. Ibarra^{1*}

¹Departamento de Biotecnología y Bioquímica, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN-Unidad Irapuato, Apartado Postal 629, Irapuato, Gto. Mexico; ²DICIVA, Universidad de Guanajuato, Irapuato, Gto., Mexico; ³CIIDIR- Durango, Instituto Politécnico Nacional, Durango, Dgo., Mexico.

***: Corresponding author:** Jorge E. Ibarra, jorge.ibarra@cinvestav.mx.

ORCID: [0000-0002-1013-8260](https://orcid.org/0000-0002-1013-8260).

Figure S1





Figure S2



Supplementary figure legends

Figure S1. Seeds where endophytic strains of *Bacillus thuringiensis* were isolated from. 1: *Allium* sp., 2: *Amelanchier denticulata*, 3: *Anoda cristata*, 4: *Buddleja scordioides*, 5: *Cyperus andinus*, 6: *Dalea bicolor*, 7: *Datura* sp., 8: *Dysphania graveolens*, 9: *Heterosperma pinnatum*, 10: *Kali tragus*, 11: *Lepidium virginicum*, 12: *Medicago polymorpha*, 13: *Mimosa aculeaticarpa*, 14: *Opuntia joconostle*, 15: *Pinus chihuahuana*, 16: *Salvia microphylla*, 17: *Solanum rostratum*, 18: *Sonchus oleraceus*, 19: *Tithonia tubaeformis*, 20: *Vachellia farnesiana*.

Figure S2. Phase contrast micrographs of sporangia from the 20 endophytic *B. thuringiensis* strains isolated from plant seeds.