

Supplementary Table 4. Adverse events in the intention to treat population

	Grade 1-2, No (%)	Grade 3, No (%)	Grade 4, No (%)	Grade 5, No (%)
Fatigue	62 (100)	6 (10)	0 (0)	0 (0)
Anemia	62 (100)	13 (21)	0 (0)	0 (0)
Lymphopenia	62 (100)	2 (3)	0 (0)	0 (0)
Abdominal pain	62 (100)	10 (16)	0 (0)	0 (0)
Dry mouth	62 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Arthralgia	61 (98)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Vomiting	53 (85)	9 (15)	0 (0)	0 (0)
Alkaline phosphatase increase	44 (71)	1 (2)	0 (0)	0 (0)
Hypomagnesemia	41 (66)	6 (10)	0 (0)	0 (0)
Constipation	38 (61)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Anorexia	38 (61)	2 (3)	0 (0)	0 (0)
Nausea	37 (60)	1 (2)	0 (0)	0 (0)
AST increased	34 (55)	1 (2)	1 (2)	0 (0)
Lipase increased	34 (55)	5 (8)	0 (0)	0 (0)
Pruritus	32 (52)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Creatine increased	31 (50)	3 (5)	0 (0)	0 (0)
Dyspnea	29 (47)	2 (3)	0 (0)	0 (0)
Hypothyroidism	29 (47)	0 (0)	1 (2)	0 (0)
Gastroesophageal reflux	25 (40)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Urea increased	24 (39)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Oedema	24 (39)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
ALT increase	23 (37)	4 (6)	1 (2)	0 (0)
Back pain	23 (37)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Xerosis	21 (34)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Tearing eye	19 (31)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Headache	19 (31)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Bilirubin total increased	19 (31)	2 (3)	1 (2)	0 (0)
Bowel obstruction	0 (0)	18 (29)	0 (0)	1 (2)
Musculoskeletal pain	18 (29)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Peripheral neuropathy	18 (29)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Weight loss	17 (27)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
GGT increased	16 (26)	3 (5)	0 (0)	0 (0)
Cough	16 (26)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Hyperthyroidism	15 (24)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Dry eye	12 (19)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Diabetes mellitus	12 (19)	4 (6)	1 (2)	0 (0)
Subocclusive syndrome	11 (18)	2 (3)	0 (0)	1 (2)
Pyrexia	11 (18)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Hematuria	11 (18)	3 (5)	0 (0)	0 (0)
Hypercalcemia	11 (18)	1 (2)	0 (0)	0 (0)
TSH increased	9 (15)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Venous thrombosis	9 (15)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Rectocele	8 (13)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Pelvic pain	7 (21)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Cruralgia	7 (21)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Mucositis	7 (21)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Ascite	6 (10)	3 (5)	0 (0)	0 (0)
Grastralgia	6 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Hemorrhoidal crisis	6 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Stomatitis	6 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Chronic kidney disease	6 (10)	1 (2)	0 (0)	0 (0)
Cystitis	6 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Watering eye	6 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Renal failure	0 (0)	6 (10)	0 (0)	1 (2)
Diarrhea	0 (0)	4 (6)	0 (0)	0 (0)
Stoma complication	0 (0)	4 (6)	0 (0)	0 (0)
Physical health deterioration	0 (0)	3 (5)	0 (0)	0 (0)
Hypokaliemia	0 (0)	3 (5)	2 (3)	0 (0)
Hyponatremia	0 (0)	3 (5)	0 (0)	0 (0)
Pleural effusion	0 (0)	3 (5)	0 (0)	0 (0)
Nephritis	0 (0)	3 (5)	0 (0)	0 (0)
Urinary infection	0 (0)	3 (5)	0 (0)	0 (0)
Blood pressure high	0 (0)	3 (5)	0 (0)	0 (0)
Pulmonary embolism	0 (0)	2 (3)	0 (0)	0 (0)
Cholestasis	0 (0)	2 (3)	0 (0)	0 (0)
Infection	0 (0)	2 (3)	0 (0)	0 (0)
Sepsis	0 (0)	2 (3)	0 (0)	0 (0)
Hypertension	0 (0)	2 (3)	0 (0)	0 (0)
Vena cava thrombosis	0 (0)	2 (3)	0 (0)	0 (0)
Pain	0 (0)	2 (3)	0 (0)	0 (0)
Epileptic seizure	0 (0)	2 (3)	0 (0)	0 (0)
Renal tubular disorder	0 (0)	0 (0)	2 (3)	0 (0)
Malnutrition	0 (0)	1 (2)	0 (0)	0 (0)
Impaired liver function	0 (0)	1 (2)	0 (0)	0 (0)
Thrombocytopenia	0 (0)	0 (0)	1 (2)	0 (0)
Lumbar pain	0 (0)	1 (2)	0 (0)	0 (0)
Pelvicaliectasie	0 (0)	1 (2)	0 (0)	0 (0)
Vaginal bleeding	0 (0)	1 (2)	0 (0)	0 (0)

Only grade 1-2 occurring in more than 10% of the patients and all the grade 3-5 adverse events are described